Que faire ? En situation de cas COVID Avéré

SNUipp FSU

<table>
<tr><th></th><th>Élève maternelle</th><th>Élève élémentaire</th><th>Personnel</th></tr>
<tr><td rowspan="3">COVID 19</td><td colspan="3">Tous les élèves deviennent cas contact, quittent l'école, seuls les agent·es restent à l'école.
Aucun cas contact du seul fait du port du masque. La cantine et le périscolaire sont de la responsabilité des collectivités territoriales.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Si 3 élèves cas covid de fratries différentes, tous les élèves sont cas contacts : la classe ferme.
Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent être également considérés comme contacts à risque.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Isolement :
10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre. En cas de fièvre au 7ème jour, l'isolement se poursuit jusqu'à 48h après la disparition des symptômes.
- s'agissant des élèves non testés, ils font l'objet d'une éviction jusqu'à l'arrêt des signes (10 jours minimum). Une éviction additionnelle de 48 heures après la disparition de la fièvre est recommandée.
- pour les cas asymptomatiques 10 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif.</td><td>Isolement :
10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre. En cas de fièvre au 7ème jour, l'isolement se poursuit jusqu'à 48h après la disparition des symptômes.
10 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques.</td></tr>
<tr><td>Variant britanique</td><td colspan="3">La conduite à tenir lors de la survenue d un cas confirmé de la variante britannique est la même que pour le cas général.
Selon l'analyse locale, en lien avec l'ARS, la fermeture de classe pourra toutefois être envisage dès le premier cas.</td></tr>
<tr><td>Variant sud africain ou brésilien</td><td colspan="3">Fermeture de la classe. Tous les élèves de la classe sont cas contacts à risque. Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent également être considérés comme contacts à risque. <u>L'apparition de l'une de ces variantes chez un personnel n'implique pas automatiquement la fermeture de la classe.</u>
Isolement impératif de 10 jours et un test de sortie d'isolement doit être systématiquement réalisé. La levée de l'isolement est alors conditionnée à l'obtention d'un résultat de test négatif et en l'absence de fièvre depuis plus de 48h pour les personnes symptomatiques. Si le test revient positif, l'isolement est prolongé de 7 jours après ce résultat. Un test à l'issue de cette deuxième période d'isolement (àJ17) n'est pas nécessaire pour le retour à l' école.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Mise à jour le 11 mars</td></tr>
</table>